

BREYANZI es un medicamento de prescripción usado para tratar el linfoma de células B grandes, un tipo de linfoma ahodgkiniano, cuando:

- su primer tratamiento no funcionó o su cáncer volvió en menos de un año de su primer tratamiento O
- su primer tratamiento no funcionó o su cáncer volvió después del primer tratamiento y usted no es elegible para un trasplante de células madre hematopoyéticas debido a sus condiciones médicas o su edad O
- al menos dos tipos de tratamiento no funcionaron o dejaron de funcionar.

BREYANZI es diferente a otros medicamentos contra el cáncer porque está elaborado con sus propios glóbulos blancos, que fueron modificados genéticamente para que reconozcan y ataquen las células de su linfoma.

Preguntas sobre Breyanzi® a realizar a su médico



Traiga esta guía con usted a su próxima cita e inicie la conversación con su equipo de atención médica para ver si Breyanzi es adecuado para usted.

- ¿Qué es Breyanzi?
- ¿En qué se diferencia Breyanzi de otros tratamientos (tales como quimioterapia o trasplante de células madre)?
- ¿Es posible la remisión con Breyanzi?
- ¿Cómo se comparan los resultados observados con Breyanzi con otros tratamientos?
- ¿Qué efectos secundarios debo conocer?
- ¿Breyanzi es adecuado para mí? ¿Qué necesito hacer a continuación?
- ¿Qué implica el proceso de tratamiento? ¿Usted estará disponible durante todo el tratamiento?
- ¿Cómo será mi vida diaria durante el proceso de tratamiento con Breyanzi?
- ¿Necesito tener un cuidador durante todo el tratamiento?
- ¿Hay programas de apoyo disponibles a través de Bristol Myers Squibb, u otras organizaciones, que puedan ayudarme durante todo el proceso de tratamiento?

Haga clic para ver la [Información importante de seguridad en las páginas 2-4](#) y la [Información de prescripción completa, incluyendo los recuadros de ADVERTENCIA y la Guía del medicamento.](#)

Breyanzi[™]
(lisocabtagene maraleucel) SUSPENSION FOR IV INFUSION

Información importante de seguridad

¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre BREYANZI?

BREYANZI puede causar efectos secundarios que son potencialmente mortales y causar la muerte. Llame a su proveedor de atención médica u obtenga ayuda de emergencia de inmediato si presenta cualquiera de los siguientes síntomas:

- dificultad para respirar
- náuseas, vómitos, diarrea intensas
- fiebre (100.4 °F/38 °C o más alta)
- latidos cardíacos irregulares o acelerados
- escalofríos/temblores
- mareos/aturdimiento
- confusión
- debilidad o fatiga intensa

Es importante que informe a sus proveedores de atención médica que ha recibido BREYANZI y que les muestre su Tarjeta de paciente de BREYANZI para billetera. Su proveedor de atención médica puede darle otros medicamentos para tratar sus efectos secundarios.

Antes de recibir BREYANZI, informe a su proveedor de atención médica sobre todos sus problemas médicos, incluyendo si tiene o tuvo:

- Problemas neurológicos (como convulsiones, accidente cerebrovascular o pérdida de memoria)
- Problemas hepáticos
- Problemas pulmonares o respiratorios
- Problemas renales
- Problemas cardíacos
- Una infección reciente o en curso

Informe a su proveedor de atención médica acerca de todos los medicamentos que toma, incluyendo medicamentos de venta con receta médica y de venta libre, vitaminas y complementos a base de hierbas.

¿Cómo recibiré BREYANZI?

- BREYANZI se fabrica a partir de sus propios glóbulos blancos, de forma que su sangre se obtendrá mediante un proceso llamado leucoféresis.
- Toma aproximadamente de 3 a 4 semanas desde el momento en que el centro de producción recibe sus células hasta que están disponibles para ser enviadas a su proveedor de atención médica, pero este tiempo puede variar.
- Antes de recibir BREYANZI, recibirá 3 días de quimioterapia para preparar su cuerpo.

Vea la **Información de prescripción completa**, incluyendo los recuadros de **ADVERTENCIA** y la **Guía del medicamento**.



Información importante de seguridad

¿Cómo recibirá BREYANZI? (continuación)

- Cuando BREYANZI esté listo, su proveedor de atención médica se lo administrará a través de un catéter que le colocarán en la vena. BREYANZI se administra como infusiones de 2 tipos diferentes de células.
 - Recibirá infusiones de un tipo de células, seguido de inmediato por el otro tipo de células.
 - El tiempo de la infusión variará, pero normalmente será menos de 15 minutos para cada uno de los 2 tipos de células.
- Durante la primera semana, el centro donde recibió el tratamiento le monitoreará diariamente.
- Deberá planificar mantenerse cerca de esta ubicación durante al menos 4 semanas después de recibir BREYANZI. Su proveedor de atención médica revisará que el tratamiento esté funcionando y le ayudará con cualquier efecto secundario que pueda ocurrir.
- Es posible que deba ingresar al hospital a causa de los efectos secundarios y su proveedor de atención médica le dará el alta si sus efectos secundarios están bajo control y es seguro para usted abandonar el hospital.
- Su proveedor de atención médica querrá hacerle análisis de sangre para hacer seguimiento a su evolución. Es importante que le realicen análisis de sangre. Si pierde una cita, llame a su proveedor de atención médica lo antes posible para reprogramarla.

¿Qué debo evitar después de recibir BREYANZI?

- No maneje, opere maquinaria pesada ni realice otras actividades que podrían ser peligrosas si no está mentalmente alerta, durante al menos 8 semanas después de recibir BREYANZI, ya que el tratamiento puede causar problemas temporales de memoria y coordinación, incluyendo somnolencia, confusión, mareos y convulsiones.
- No done sangre, órganos, tejidos ni células para trasplante.

¿Cuáles son los efectos secundarios posibles o razonablemente probables de BREYANZI?

Los efectos secundarios más frecuentes de BREYANZI son:

- fatiga
- dificultad para respirar
- fiebre (100.4 °F/38 °C o más alta)
- escalofríos/temblores
- confusión
- dificultad para hablar o problemas de dicción
- náuseas, vómitos, diarrea intensas
- dolor de cabeza
- mareos/aturdimiento
- latidos cardíacos irregulares o acelerados
- hinchazón

Vea la **Información de prescripción completa**, incluyendo los recuadros de **ADVERTENCIA** y la **Guía del medicamento**.



Información importante de seguridad

¿Cuáles son los efectos secundarios posibles o razonablemente probables de BREYANZI? (continuación)

BREYANZI puede aumentar el riesgo de infecciones potencialmente mortales que pueden provocar la muerte. Informe de inmediato a su proveedor de atención médica si tiene fiebre, escalofríos o cualquier signo o síntoma de infección.

BREYANZI puede reducir uno o más tipos de sus células sanguíneas (glóbulos rojos, glóbulos blancos o plaquetas). Después del tratamiento, su proveedor de atención médica le realizará análisis de sangre para revisar si esto ocurre.

Informe de inmediato a su proveedor de atención médica si tiene fiebre, cansancio o presenta moretones o sangrado.

La presencia de BREYANZI en la sangre puede causar un resultado falso positivo en la prueba de detección del VIH en algunas pruebas comerciales.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de BREYANZI. Llame a su médico para consultar acerca de los efectos secundarios. Para obtener más información, visite BREYANZI.com o llame al 1-888-805-4555. Puede comunicar los efectos secundarios a la FDA. Consulte www.fda.gov/medwatch o llame al 1-800-FDA-1088.

Vea la **Información de prescripción** completa, incluyendo los **recuadros de ADVERTENCIA** y la **Guía del medicamento**.

Haga clic para ver la **Información importante de seguridad** en las páginas 2-4 y la **Información de prescripción completa, incluyendo los recuadros de ADVERTENCIA y la Guía del medicamento**.



© 2023 Juno Therapeutics, Inc., a Bristol-Myers Squibb Company. Todos los derechos reservados. BREYANZI y el logotipo relacionado son marcas registradas de Juno Therapeutics, Inc., una compañía de Bristol Myers Squibb. CELL THERAPY 360 y el logotipo relacionado son marcas comerciales de Celgene Corporation, a Bristol Myers Squibb company. 02/23 2009-US-2300012

